

## El día *antes* de su procedimiento...

### lo que **PUEDA** hacer:

- **SÓLO** podrá tomar un desayuno ligero o líquidos translúcidos; no coma nada a la hora de la cena

### lo que **NO PUEDE** hacer:

- **NO** tome leche
- **NO** coma ni tome nada de color rojo o violeta
- **NO** tome bebidas alcohólicas

### Puede tomar cualquiera de los siguientes líquidos:

- Agua
- Jugos de fruta colados (sin pulpa) incluido jugo de manzana, naranja, uvas blancas o arándanos blancos
- Limonada o "limada"
- Café o té (**NO** use ningún tipo de crema, ni láctea ni artificial)
- Caldo de pollo
- Postres de gelatina sin agregado de frutas o glaseado (**QUE NO SEAN ROJOS NI PÚRPURA**)

### Nota:

- El Kit de Preparación Intestinal SUPREP está indicado para la limpieza del colon como preparación de la colonoscopia en adultos.
- Asegúrese de informar a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluso medicamentos con receta, de venta libre, vitaminas y complementos herbáceos. El Kit de Preparación Intestinal SUPREP puede interferir con el funcionamiento de otros medicamentos.
- Es posible que los medicamentos orales no se absorban en forma adecuada si se toman dentro de la primera hora posterior a la ingestión de cada dosis del Kit de Preparación Intestinal SUPREP.
- Las reacciones adversas más comunes después de la administración del Kit de Preparación Intestinal SUPREP fueron en general molestias, distensión abdominal, dolor abdominal, náuseas, vómitos y dolor de cabeza.
- Si tiene preguntas sobre el Kit de Preparación Intestinal SUPREP, llame a su médico.

(Consulte la otra página para obtener instrucciones adicionales).

Lea la Guía del medicamento y la Información completa sobre la prescripción incluidas con el kit.

Para obtener más información sobre este producto, llame al 1-800-874-6756 o visite nuestro sitio web en [www.supreokit.com](http://www.supreokit.com)

## INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

### SU PROCEDIMIENTO

Hora/Fecha:

Lugar:

Si tiene preguntas, comuníquese con su proveedor de atención médica al:

**PLENVU®**  
Powder for Oral Solution  
PEG 3350, Sodium Ascorbate, Sodium Sulfate, Ascorbic Acid, Sodium Chloride, and Potassium Chloride  
140 g | 48.11g | 9g | 7.54g | 5.2g | 2.2g

Pauta posológica dividida en 2 días

Si empieza a tomar PLENVU la **noche** antes de su colonoscopia, **aquí le explicamos cómo prepararse**

Fecha de la colonoscopia: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Lugar de la colonoscopia: \_\_\_\_\_

Hora de la colonoscopia: \_\_\_\_\_ A. M./P. M. No se debe beber nada después de: \_\_\_\_\_ A. M./P. M.

**Noche**

Dosis 1 de PLENVU:

Fecha: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Día de la semana: L M X J V S D

Hora: \_\_\_\_\_ P. M.


**Mañana**

Dosis 2 de PLENVU:

Fecha: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_


Día de la semana: L M X J V S D

Hora: \_\_\_\_\_ A. M.



Nota: la solución real es clara.

ESPERE APROXIMADAMENTE  
**12 HORAS**  
DESDE EL COMIENZO  
DE LA DOSIS 1



LISTO PARA LA  
COLONOSCOPIA



**¡Manténgase hidratado/a!**

Es importante que tome líquidos claros antes, durante y después de su preparación.

Deje de beber líquidos **al menos 2 horas** antes de la colonoscopia o según lo recomendado por su proveedor de asistencia sanitaria.

**Tome la dosis 1:**

1. Use el recipiente de mezcla para mezclar el contenido del sobre de la dosis 1 con al menos 16 onzas líquidas (473 ml) de agua agitándolo todo o usando una cuchara hasta que se disuelva por completo. Esto puede tardar de 2 a 3 minutos. Tómese su tiempo: termine lentamente la dosis en 30 minutos.
2. Vuelva a llenar el recipiente con al menos 16 onzas líquidas (473 ml) de líquido transparente. De nuevo, tómese su tiempo y termínelo lentamente en 30 minutos. Continúe bebiendo otros líquidos claros durante la noche.

**Espere aproximadamente 12 horas desde el comienzo de la dosis 1, y entonces...**

**Tome la dosis 2:**

1. Use el recipiente de mezcla para mezclar el contenido de la dosis 2 (sobre A y sobre B) con al menos 16 onzas líquidas (473 ml) de agua agitándolo o usando una cuchara hasta que se disuelva por completo. Esto puede tardar de 2 a 3 minutos. Tómese su tiempo: termine lentamente la dosis en 30 minutos.
2. Vuelva a llenar el recipiente con al menos 16 onzas líquidas (473 ml) de líquido transparente. De nuevo, tómese su tiempo y termínelo lentamente en 30 minutos. Siga bebiendo líquidos claros, pero asegúrese de dejar de beber líquidos al menos 2 horas antes de la colonoscopia o según lo recomendado por su proveedor de asistencia sanitaria.

**Para obtener información completa, consulte el prospecto y las instrucciones de uso en la información sobre prescripción.**

**CONSEJO ÚTIL:** PLENVU puede refrigerarse. Úselo en las 6 horas posteriores a mezclarlo con agua.

**INDICACIÓN**

PLENVU® (polietilenglicol 3350, ascorbato de sodio, sulfato de sodio, ácido ascórbico, cloruro de sodio y cloruro de potasio para solución oral) es un medicamento recetado que los adultos usan para limpiar el colon antes de una colonoscopia.

**INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD**

- No tome PLENVU si padece un bloqueo intestinal (obstrucción intestinal), una abertura en la pared del estómago o el intestino

(perforación intestinal), problemas con el vaciado de alimentos o líquidos del estómago (retención gástrica), un problema de desplazamiento demasiado lento de la comida a través de sus intestinos (íleo), un intestino grueso muy dilatado o alergia a alguno de los ingredientes de PLENVU.

**Consulte la información importante de seguridad adicional en la parte posterior y toda la información de prescripción adjunta, incluido el prospecto y las instrucciones de uso.**